

MaXsil

Silicato Líquido Complejo

FERTILIZANTE LÍQUIDO COMPLEJADO DE SILICATO DE POTASIO PARA FERTILIZACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN.

Composición (%p/p):

Potasio (P)	6.0%
Silicio (Si)	1.36%
Nitrógeno (N)	10.0%

GRADO 10-0-6 GRADO EQUIVALENTE 10-0-7

Densidad (relativa 20°C): 1.22 g/ml

pH: 12.2

Reacción al suelo: ácida (-16)

Registrado por: MBFi ARGENTINA S.A.

Caamaño 699, Villa Rosa, Buenos Aires (CP 1631)

N°Registro SENASA: 19.024

ORIGEN SUDÁFRICA: MBFi (PTY) LTD • Reg No: 2013/211882/07

144, Avenue 2, Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210.

Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

Volumen neto

20 L



Leaders In Science, Partners in Growth.

ARGENTINA 001

PRODUCTIVIDAD

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones

Cultivos extensivos:	
Foliar	Diluir 200 ml/100 L de agua y aplicar al cultivo (Máximo de 2 L/ha por hectárea en caudales elevados de agua).
Al suelo	Aplicar de 2.5-10 L/ha.
Cultivo de Árboles y Viñedos:	
Foliar	Diluir 250 ml/100 L de agua y aplicar como una aplicación de cobertura total (Concentración máxima de 5 L/ha en grandes volúmenes de agua).
Al suelo	5-10 L/ha por aplicación, diluir 1:1000 y aplicar 3-6 veces durante los períodos de crecimiento.

- Usar exclusivamente como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- Reacción al suelo: ácida (ÁCIDA, -16).
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Mantener fuera de la luz solar directa.

“SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0,5%-1%) O JUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS”
ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO
NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN
UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTAR CON HOJAS DE SEGURIDAD, INFORMANDO EL VALOR DE PH

Mezcla y proceso de aplicación: Maxsil debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. Las dosis de uso dependen de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales. Realice todas las aplicaciones de manera foliar o al suelo. Cuando lo agregue a la mezcla del tanque de pulverizado, no regule el pH por debajo de 7. Realice la dilución del producto de acuerdo a lo recomendado en la tabla “Guía general de aplicación”. Maxsil es un silicato complejo y se puede mezclar con nutrientes como Ca y Mg, pero limite el tiempo de mezcla. Si es posible, aplicar por separado en 2 aplicaciones diferentes al cultivo. En aplicaciones de fertirriego el agua utilizada no debe tener una conductividad eléctrica superior a los 2 mS/cm.

Almacenamiento: Maxsil debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Aplicar en concentraciones entre 0.2%-5%.

Estas dosis son orientativas, pudiendo variar según análisis de suelo y/o foliar y el consejo del ingeniero agrónomo de la zona.

Cultivos	Foliar: Dosis/100L	Fertirriego: Dosis/100L	Momento de aplicación
Almácigos		30 ml	Aplicar semanalmente como drench.
Bayas: Arándano, Frutilla, Mora	200 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Brócoli, Coles de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Mostaza, Repollo	200 ml	250 ml-1 L	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.

Cultivos	Foliar: Dosis/100L	Fertirriego: Dosis/100L	Momento de aplicación
Caña de Azúcar	250 ml		Realizar la primera aplicación a 30 cm de altura de la planta, repetir a los 28 días.
Cereales: Arroz, Cebada, Sorgo, Trigo	200 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación en etapa de macollaje, repita en la hoja bandera.
Césped	200 ml	250 ml-1 L	Realizar aplicaciones cada 14-21 días.
Citrus: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	250 ml (Max 5 L/ha)	500 ml-1L por aplicación	Foliar: Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días, comenzando a principios de la primavera (Septiembre). Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.
Cucurbitáceas: Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Zapallos	200 ml	250 ml-1 L	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Frambuesa	200 ml	250 ml-1 L	Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días.
Frutales de carozo: Almendro, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Nectarina, Pelones	250 ml (Max 5 L/ha)	500 ml-1 L por aplicación	Foliar: Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días desde el comienzo de la floración. Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.
Frutales de Pepita: Manzana, Pera	250 ml (Max 5 L/ha)	500 ml-1 L por aplicación	Foliar: Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre). Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.
Frutas subtropicales: Mango, Olivo, Palta	250 ml	500 ml-1 L por aplicación	Foliar: Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre). Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.
Girasol	250 ml	250 ml-1 L	Realizar la primera aplicación a 20 cm de altura de la planta, repetir durante la floración.
Hortalizas de bulbo: Ajo, Cebolla, Ciboulette, Puerro	250 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Hortalizas de fruto: Pimiento, Tomate	250 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Hortalizas de raíz y tubérculo: Batata, Rábano, Remolacha, Zanahoria	200 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Kiwi	200 ml	500 ml-1 L por aplicación	Foliar: Realizar 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con 14-28 días de diferencia. Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.

Cultivos	Foliar: Dosis/100L	Fertirriego: Dosis/100L	Momento de aplicación
Legumbres: Arvejas, Garbanzo, Lentejas, Porotos con vaina, Porotos secos	200 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación en la etapa de 4-8 hojas, repita durante la floración.
Maíz	200 ml (Max 400 ml/ha)	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación en V4 y repita en la etapa de crecimiento V8.
Mani	250 ml	250 ml-1 L	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Nogales: Avellano, Macadamia, Nuez, Pecanes, Pistacho	250 ml (Max 5 L/ha)	500 ml-1L por aplicación	Foliar: Realice de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre). Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.
Ornamental	200 ml	250 ml-1 L	Aplicar cada 14-21 días.
Papas	250 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Soja	250 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación en V4 y repita en R1-2.
Tabaco	200 ml	250 ml-1 L	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 21 días.
Verduras de hoja: Acelga, Berro, Espinaca, Lechuga, etc.	200 ml	250 ml-1 L	Realizar la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14-21 días.
Uva de mesa y vino	250 ml (Max 5 L/ha)	500 ml-1L por aplicación	Foliar: Realizar de 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-21 días, comenzando a principios de la primavera (Septiembre/Octubre). Fertirriego: Aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento.