





PROGRAMA DE MANEJO: PALTO



Estadio Fenológico	Producto	Dosis / 100 lts Agua	Dosis por Ha	Volumen de Agua sugerido	Aplicación	Objetivo	Observaciones Generales
Antes de brotación - Cuaja y post Cosecha	Criss Cross		200 gr/ha	Diluir en 5 lts de agua previamente	Fertiriego		Comienzo de primavera
Antes de brotación - Cuaje y post Cosecha	Priority WP		250 gr - 500gr/ha	Diluir en 5 lts de agua previamente	Fertiriego	Promover desarrollo radicular, Preventivo ante enfermedades de suelo, Incrementa la eficiencia de toma de nutrientes y de agua.	Se recomienda hacer 2-4 aplicaciones por temporada de cultivo.
Antes de brotación - Cuaje y post Cosecha	Microphos		1,5 lts/ha	Diluir en 5 lts de agua previamente	Fertiriego	Solubilizar fosforo del suelo. Promover desarrollo radicular, Activa SAR, Incrementa la eficiencia de toma de nutrientes y de agua	Se recomienda hacer 3 aplicaciones por temporada de cultivo.
Vegetativo	Bio-Finalist Functional Xtra	200-400 cc	2 lts	1200-1500 lts/ha	Foliar	Nutrir y promover crecimiento aumentando ATP . Favorece la recuperación ante stress. ayuda con las auxinas y el salicílico a homogeneizar la brotación	Iniciar en brotación.
Vegetativo	X-Treem N		5 - 20 lts	800-1200 lts/ha	Foliar y Fertirriego	Nitrógeno Polimerizado + Mg + S, de liberación lenta.	Iniciar en brotación.
Floración	Bio-Finalist Technical	100-300 cc	3 - 5 lts	1200-1500 lts/ha	Foliar y Fertirriego	Bajar los niveles de etileno para favorecer la cuaja. Mejora la fructificación. Mejora Cuaja y el peso de fruta.	3 aplicaciones. Iniciar al 50 % de floración y repetir cada 14-21 días.
Floración, cuaje y maduración de frutos	Bio-Finalist Instructor	25-30 ml	300 ml	1200-1500 lts/ha	Foliar	Promueve la actividad hormonal en general, favoreciendo la polinización, fecundacion, crecimiento y tamaño de frutos.	3 aplicaciones. Iniciar al 50% de floración y repetir cada 28 días.
Durante todo el ciclo	Carbium	200 gr	3 - 5 kg	1200-1500 lts/ha	Foliar	Suplementa Potasio a los cultivos, Acción preventiva ante enfermedades fúngicas. Sin período de carencia. Sin MRL.	Iniciar en primavera y repetir cada 21-25 días según condiciones ambientales.
Maduración, post cosecha	Bio-Finalist MoB		4 lts	800-1200 lts/ha	Foliar	Favorece llenado de Frutos. Incrementa la producción y movimiento de Azúcares. Uniformizar la maduración	Comenzar 40 días antes de cosecha . En 2 aplicaciones.
Maduración, post cosecha	Bio-Finalist Vitality		5 lts	800-1200 lts/ha	Foliar	Favorece llenado de Frutos. Aporta aminoácidos clave como Arginina, incrementa la producción y movimiento de Azúcares. Uniformizar la maduración	Comenzar 40 días antes de cosecha . En 2 aplicaciones.
Maduración, post cosecha	PolyPhate K		Máximo 5 lts	800-1200 lts/ha	Foliar y Fertirriego	Suplir carencias de PolyPhate K.	Es de liberación lenta en el cultivo.
Durante todo el ciclo. Se puede aplicar solo o junto a fungicidas sistémicos o de contacto, cuando aparezcan enfermedades (Oomycetes) o preventivo	SBF	200 - 300 ml	6 lts	1200-1500 lts/ha	Foliar y Fertirriego	Fosfito de Potasio Polimerizado de pH Neutro, con ácido Salicílico. Previene desarrollo de enfermedades. Mejora la resistencia natural de las plantas (SAR)	Realizar 4-6 aplicaciones con intervalos de 14-28 días

PROGRAMA DE MANEJO: PALTO



Estadio Fenológico	Producto	Dosis / 100 lts Agua	Dosis por Ha	Volumen de Agua sugerido	Aplicación	Objetivo	Observaciones Generales
Durante todo el ciclo. Se puede aplicar solo o junto a fungicidas sistémicos o de contacto	Incite (Bacillus Methylophilus)		2 lts	2 lts/ha Foliar ó 4 lts/ha Fertirriego	Foliar y Fertirriego	Bioestimulante, Biocontrolador. Favorece la resistencia natural de las plantas (SAR).	Realizar 3-4 aplicaciones desde brotación en adelante y repetir según necesidad
Durante todo el ciclo. Se puede aplicar solo o junto a fungicidas sistémicos o de contacto	Signal (Cobre, Manganeso, Zinc + Ac Salicílico)	300 ml	2 - 4 lts	2-3 lts/ha Foliar ó 3-5 lts/ha Fertirriego	Foliar y Fertirriego	Favorece la resistencia natural de las plantas (SAR). Induce cierre de estomas ante estrés hídrico o térmico.	Realizar 3-4 aplicaciones desde brotación en adelante y repetir según necesidad
Desde Brotación hasta maduración de frutos	MaxSil	250 ml	3 - 4 lts	3-4 lts/ha Foliar ó 5 -10 lts/ha Fertirriego	Foliar y Fertirriego	Incrementa la resistencia ante estrés de temperatura y falta de agua. Promueve resistencia ante enfermedades (SAR). Mejora la resistencia ante excesos de sodio y metales pesados	Realizar 4-6 aplicaciones con intervalos de 14-28 días desde primavera
Flush de crecimiento de raíces	Bio-Finalist Technical	20 cm3 por planta	4 lts	1200-1500 lts/ha	Fertirriego	Aumenta la eficiencia de uso de nutrientes, aumenta el desarrollo radicular, en especial las raíces secundarias, baja la toxicidad en raíces de metabolitos ROS, aumenta el aporte de hormonas de crecimiento	Aplicar desde Primavera hasta comienzo de verano (Oct-Dic) cada 7-10 días hasta 4 aplicaciones anuales

Los problemas fisiológicos en Palto son:

Problema	Solución
- Mejora de cuaja y retención de frutos.	Technical + Instructor
- Potenciar el sistema radicular.	Technical
- Potenciar el sistema inmune.	SBF, Signal, Priority, Incite
- Llenado de fruto y calibre.	MoB y PolyPhate K
- Mitigar estrés térmico y salino.	Technical, Maxsil, Signal

