

X-Treem^{CaB}

Fertilizante Líquido Quelatado

FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA APLICACIÓN AL SUELO Y USO FOLIAR A BASE DE AMINOÁCIDOS.

Composición (%p/p):

Aminoácidos libres	3.04%
Calcio* (Ca)	5.0%
Boro (B)	0.7%

*Quelatado con aminoácidos

GRADO 0-0-0 GRADO EQUIVALENTE 0-0-0

Densidad (relativa al agua 25°C): 1.26 g/ml

pH: 8.3

Reacción al suelo: neutro



Registrado por:

MBFI ARGENTINA S.A.

Caamaño 699, Villa Rosa, Buenos Aires, (CP 1631)

N° Registro SENASA: 18.893

ORIGEN SUDÁFRICA

MBFI (PTY) LTD

Reg No: 2013/211882/07

144 Avenue 2, Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210.

Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

Contenido Neto:

20 L

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones

Foliar	Se recomienda utilizar una dosis comprendida entre 0.2-0.5% v/v y aplicar en cobertura total.
Al suelo	10-20 L/ha por aplicación, diluir 1:2000 y aplicar 3-6 veces durante el período de crecimiento.

- Usar exclusivamente como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- pH óptimo de aplicación 5.5–6.5.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Mantener fuera de la luz solar directa.
- Este producto contiene Boro. El uso inadecuado puede causar daño a los cultivos.

“SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0.5-1%), O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS”
ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO
NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN
PROHIBIDO SU USO EN CULTIVOS DE TABACO POR CONTENER CLORO EN SU FORMULACIÓN

Mezcla y proceso de aplicación: X-Treem CaB debe ser aplicado preferentemente durante las primeras horas del día o últimas horas de la tarde. La dosis para aplicar depende de la fertilidad del suelo y el criterio utilizado. Las menores dosis corresponden a objetivo de mantenimiento de la fertilidad y las dosis más altas para corrección de deficiencias nutricionales.

Almacenamiento: X-Treem CaB debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones sin heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evite la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Estas dosis son orientativas, pudiendo variar según análisis de suelo y/o foliar y el consejo del ingeniero agrónomo de la zona.

Cultivos	Dosis/ha aplicación foliar	Dosis/ha aplicación al suelo	Momento de aplicación
Ajo, Cebolla, Papa, Tomate	1-3 L	10-20 L/ha	Realizar en aplicaciones semanales.
Algodón	3 L	10-20 L/ha	1ª aplicación: 60 días después de la emergencia; 2ª aplicación: 90 días después de la emergencia; 3ª aplicación: 110 días después de la emergencia.
Berenjena, Calabaza, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Verdura en general	1-2 L	10-20 L/ha	Realizar aplicaciones semanales.
Cereales: Arroz, Avena, Cebada, Trigo	1.5-2 L	10-20 L/ha	Realizar 1 aplicación previa a antesis.
Cítricos	7 L (200-500 ml dosis/hl de agua)	10-20 L/ha	Realizar 2 aplicaciones: antes y después de que ocurra la floración.
Flores	500 ml-1.5 L	10-20 L/ha	Aplicar en intervalos de 15 días.
Frutales de carozo, Frutales subtropicales, Manzana, Pera	2-3 L (200-500 ml dosis/hl de agua)	10-20 L/ha	Realizar 1 aplicación antes de la floración y luego de 8-10 aplicaciones en intervalos de 15 días una vez que haya comenzado la floración.
Girasol	3 L	10-20 L/ha	Realizar 1 aplicación en apertura del capítulo.
Maní	3 L	10-20 L/ha	Realizar 2 aplicaciones: antes y después de la floración.
Poroto: Secos y Verde	3 L	10-20 L/ha	Realizar 2 aplicaciones en los estadios R5-R7.
Soja	3 L	10-20 L/ha	Realizar 1 aplicación entre R1-R3.