

# X-Treem<sup>Fe</sup>



FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA APLICACIÓN AL SUELO Y USO FOLIAR Y FERTIRRIEGO A BASE DE HIERRO QUELATADO.

## Composición (%p/p):

|              |      |
|--------------|------|
| Hierro* (Fe) | 5.0% |
|--------------|------|

\*Quelutado con aminoácidos

GRADO 0-0-0 GRADO EQUIVALENTE 0-0-0

Densidad (relativa al agua 25°C): 1.29 g/ml

pH: 8.2

Reacción al suelo: neutra

### Registrado por:

MBFi ARGENTINA S.A.

Caamaño 699, Villa Rosa, Buenos Aires (CP 1631)

N° Registro SENASA: 18.896

### ORIGEN SUDÁFRICA

MBFi (PTY) LTD

Reg No: 2013/211882/07

144, Avenue 2, Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210.

Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: [orders@mbfi.bio](mailto:orders@mbfi.bio) • Web: [www.mbfi.bio](http://www.mbfi.bio)

Contenido Neto

20 L

**GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones**

| <b>Cultivos extensivos:</b>          |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foliar                               | Concentración mínima 1% o 1 L:100 L de agua, aplicar al cultivo (Concentración max de 3% o 3 L/100 L de agua).             |
| Al suelo                             | Aplicar 3-10 L/ha por aplicación.                                                                                          |
| Al surco                             | Aplicar 1-2 L/ha.                                                                                                          |
| <b>Cultivo de Árboles y Viñedos:</b> |                                                                                                                            |
| Foliar                               | Concentración mínima 0.5% o 0.5 L:100 L de agua, aplicar en cobertura total (Concentración max de 2% o 2 L/100 L de agua). |
| Al suelo                             | 5-10 L/ha por aplicación, diluir 1:1000 y aplicar 3-6 veces durante el periodo de crecimiento del cultivo.                 |

- Usar exclusivamente como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- pH óptimo de aplicación: 5.6-6.5.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Mantener fuera de la luz solar directa.

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0.5-1%), O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS"</b> |
| <b>ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO</b>                    |
| <b>NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN</b>                                                                                    |

**Mezcla y proceso de aplicación:** X-Treem Fe debe ser aplicado preferentemente durante las primeras horas del día o últimas horas de la tarde. La dosis a aplicar depende de la fertilidad del suelo y criterio utilizado. Las menores dosis corresponden a objetivo de mantenimiento de la fertilidad y las dosis más altas para corrección de deficiencias nutricionales. Para aplicación foliar, utilice la dosis/100 L recomendada pero no exceda la dosis máxima/ha.

**Almacenamiento:** X-Treem Fe debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones sin heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evite la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Aplicar en concentraciones de 0.1%-3%.

| Cultivos                                                    | Dosis/100 L | Dosis Max/ha | Dosis al suelo | Momentos de aplicación                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caña de azúcar                                              | 500 ml      | 2-3 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar al inicio de la etapa de crecimiento.                                                                                                                                                                                     |
| Canola                                                      | 750 ml      | 4 L          | 3-10 L/ha      | Aplicar al inicio de la temporada de crecimiento.                                                                                                                                                                                 |
| Cereales:<br>Avena, Cebada, Centeno,<br>Trigo, Arroz        | 750 ml      | 4 L          | 3-10 L/ha      | Aplicar al inicio de la temporada de crecimiento.                                                                                                                                                                                 |
| Cítricos:<br>Lima, Limón, Mandarina,<br>Naranja, Pomelo     | 300 ml      | 2-8 L        | 5-10 L/ha      | Aplicar dos veces al inicio de la estación de crecimiento con intervalos de 10-14 días. Se pueden realizar otras 2-3 aplicaciones a intervalos de 7-14 días en la etapa de maduración del fruto hasta 7 días antes de la cosecha. |
| Frutales pomáceas o de pepita:<br>Manzana, Membrillo, Peras | 300 ml      | 2-8 L        | 5-10 L/ha      | Aplicar tres veces con intervalos de 10-14 días con la primera pulverización. Se pueden realizar otras 2-3 aplicaciones a intervalos de 7-14 días en la etapa de maduración de la fruta hasta 7 días antes de la cosecha.         |
| Frutos de carozo:<br>Cereza, Ciruela, Damasco               | 300 ml      | 2-8 L        | 5-10 L/ha      | Aplicar tres veces con intervalos de 10-14 días con la primera pulverización. Se pueden realizar otras 2-3 aplicaciones a intervalos de 7-14 días en la etapa de maduración de la fruta hasta 7 días antes de la cosecha.         |
| Legumbres:<br>Arveja, Lenteja, Porotos,<br>Garbanzo         | 750 ml      | 2-4 L        | 2.5-10 L/ha    | Aplicar al comienzo de la temporada de crecimiento.                                                                                                                                                                               |
| Maíz                                                        | 1 L         | 2-4 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar al inicio del periodo de crecimiento o en el estado V4.                                                                                                                                                                   |

| Cultivos                                                 | Dosis/100 L | Dosis Max/ha | Dosis al suelo | Momentos de aplicación                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nogales:<br>Avellano, Macadamia, Nuez<br>Pecan, Pistacho | 300 ml      | 2-8 L        | 5-10 L/ha      | Aplicar tres veces con intervalos de 10-14 días con la primera. Se pueden realizar 2-3 aplicaciones en intervalos de 7-14 días en la etapa de maduración de las nueces hasta 7 días antes de la cosecha.                                   |
| Ornamentales                                             | 250 ml      | 1-2 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar a intervalos de 7 días solo cuando se presenten deficiencias. No rocíe durante la floración.                                                                                                                                       |
| Papa                                                     | 750 ml      | 3-4 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar en el comienzo de la temporada de crecimiento.                                                                                                                                                                                     |
| Soja                                                     | 1 L         | 2-3 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar en el estadio V4 y nuevamente en R1.                                                                                                                                                                                               |
| Tomate                                                   | 750 ml      | 2-4 L        | 3-10 L/ha      | Aplicar durante el crecimiento temprano y el desarrollo de frutos según sea necesario.                                                                                                                                                     |
| Uva de mesa y vinificar                                  | 250 ml      | 1-3 L        | 5-10 L/ha      | Aplicar cada 7 días solo cuando se presenten deficiencias. No pulverizar durante la floración. Se pueden realizar otras 2-3 aplicaciones a intervalos de 7-14 días en la etapa de maduración de la fruta hasta 7 días antes de la cosecha. |