

X-TreemTM ^N

Fertilizante Líquido Quelatado



FERTILIZANTE QUÍMICO COMPUESTO - FERTIRRIEGO Y USO FOLIAR.

**ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.**

Composición (% p/p):

Nitrogeno (N)	24.0 %
Magnesio (Mg)	2.0 %
Azufre (S)	2.0 %

GRADO 24-0-0 - GRADO EQUIVALENTE 24-0-0

Densidad (relativa al agua 25°C): 1.29

pH: 9.2

Índice de acidez: 7 (básico)

Registrado por: MBFI ARGENTINA S.A.
Caamaño 699, Villa Rosa, Buenos Aires (CP 1631)

N°Registro SENASA: 18.892

Origen Sudáfrica: MBFI (PTY) LTD
Reg No: 2013/211882/07 • 144, Avenue 2, Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210.
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: orders@mbfi.co.za • Web: www.mbfi.co.za
X-TreemTM es una marca registrada por MBFI Argentina S.A.

Lote: BFFXCH006/22

Fecha de Elaboración 2022/07/11

Fecha de vencimiento : 2026/07/11

Volumen neto

5 L

ARGENTINA 001

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: UTILICE SÓLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES

Aplicación foliar:	Diluir 1: 100-200 y aplicar como cobertura total sobre los cultivos.
Aplicación por fertirriego (*):	10-25 L/ha por aplicación; diluir 1:200 y aplicar 3-6 veces a través del ciclo de crecimiento de los cultivos.

- Usar exclusivamente como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- (*) La conductividad eléctrica del agua de riego no debe superar los 2 mS/cm.
- pH óptimo de aplicación 5,5 – 6,5.
- Reacción en el suelo e índice de acidez (ÁCIDA, -39).
- Para más información sobre la compatibilidad de mezcla de este producto con agroquímicos, consulte a un Ingeniero Agrónomo.

SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0.5-1%), O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO
NO APLICAR EN HORAS DE ALTA TEMPERATURA O MÁXIMA INSOLACIÓN

DETALLES DE MEZCLA Y APLICACIÓN:

X-Treem™ N debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar una prueba previa de mezclas en pequeña escala para determinar la compatibilidad con otros productos fertilizantes.

ALMACENAMIENTO:

X-Treem™ N debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un área seca y fresca en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis L/ha	Momentos de aplicación
Almácigos	50 ml/10 L de agua	Empape 10 días después de la germinación; repetir cada 14 días.
Brassicaceas: Brócoli, Coles de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Mostaza, Repollo	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Cebolla	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Cereales: Arroz, Cebada, Sorgo	5-20 L	Aplicar desde la emergencia de la hoja bandera hasta la floración.
Césped	10-25 L	Aplicar cada 21-28 días.
Citrus: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	10-20 L	Realizar 2 aplicaciones justo antes de la floración y después del cuajado.
Coles	5-20 L	Realizar 3 aplicaciones en el estadio de 4-8 Hojas; inicio de la elongación del tallo (C1) y al final de la etapa de emergencia de la inflorescencia (D2).
Cucurbitáceas: Calabaza, Melon, Pepino, Sandía, Zapallos	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Frutilla	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Girasol	5-20 L	Aplicar desde el estadio de 5-6 hojas hasta la inflorescencia.

Cultivo	Dosis L/ha	Momentos de aplicación
Lechuga	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Legumbres: Arvejas, Garbanzo, Lentejas, Mani, Porotos on vaina, Porotos secos, Porotos	2.5 L	Realizar 2 aplicaciones en el estadio de 4-8 hojas y repetir antes de la floración.
Maíz	2.5 L	Realizar 2 aplicaciones a 15cm de altura de brote; y repetir durante la floración.
Ornamentales	5-7.5 L	Aplicar cada 21-28 días.
Papa	5-7.5 L	Iniciar la aplicación al 100% de emergencia (alrededor de 3-5 semanas); repetir cada 14-21 días.
Pimiento	5-7.5 L	Iniciar la aplicación en el momento del trasplante y repetir cada 21-28 días.
Remolacha	5-20 L	Aplicar en la etapa de 4-6 hojas y repetir 28 días después.
Soja	2-5 L	Realizar 2 aplicaciones en el estadio de 4-8 Hojas; repetir durante la floración.
Tabaco	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Tomate	5-7.5 L	Aplicar en el estadio de 4 a 6 hojas; repetir cada 14-21 días.
Trigo	5-7.5 L	Realizar 2 aplicaciones en etapa de hoja bandera; repetir durante la floración (antesis).
Uva de mesa y de vinificar	5-10 L	Soporte nutricional: 2 aplicaciones desde el estado de hojas desplegadas hasta el estado de botones florales separados.
	20 L	Mejora del contenido de nitrógeno: 2 aplicaciones alrededor del ablandamiento de la baya y repetir 15 días después.
	5-20 L	Postcosecha: 1 aplicación después de la cosecha y antes del inicio de la etapa de caída de hojas.
Zanahoria	5-7.5 L	Realizar 2 aplicaciones en el estadio de 4-6 Hojas; repetir cada 14-21 días.

**ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
MANTENER FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**