



# Priority<sup>TM</sup> WP

Inoculante - Polvo Mojable

INOCULANTE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y MOJADO DE RAÍCES PARA VARIOS CULTIVOS

**Acondicionador de suelo- Ingredientes:**

**Ingrediente Activo:** *Trichoderma spp.* \* 13%

**Total de otros inertes:** Sacarosa >87%

\*Mínimo of 2 x 10<sup>9</sup> esporas/g (*Trichoderma spp.*)

Volumen neto:

**1 kg**



Leaders in Science, Partners in Growth.

**Fabricado, suministrado y Origen:**

**MBFi (PTY) LTD** - Sudáfrica

Reg No: 2013/211882/07

P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210

Tel: +27 (0) 82 738 0080

Fax: +27 (0) 86 547 6711

Email: [orders@mbfi.bio](mailto:orders@mbfi.bio) • Web: [www.mbfi.bio](http://www.mbfi.bio)



**Importado y distribuido en Bolivia por:**

**BIOTENAGRO SRL**

Av. 18 de mayo , Ed. Comercial PlazaNorte Piso 1 of. 27 N° s/n

Barrio CONVIFAG – Santa Cruz – Bolivia

Tel: (591)77677892 – (591)69086654

PADRON SENASAG REG 07-15951

**BOLIVIA 001**

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES:

Lea la etiqueta antes de usar. Si se necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Lave bien el equipo de protección y la ropa de trabajo después de manipular el producto.

### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Use gafas protectoras, camisa de manga larga, pantalones, zapatos y calcetines para minimizar el contacto.

PRIMEROS AUXILIOS	
En caso de ingestión	Obtenga asistencia médica. Se recomienda inducir el vómito si se ha ingerido un gran volumen (500 g).
En contacto con los ojos	Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Qítense los lentes de contacto, si tiene y si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: Consiga consejo o atención médica.
En contacto con la piel	En caso de excesivo contacto con la piel, se aconseja quitarse la ropa o el equipo utilizado y lavar las partes expuestas al producto con abundante agua y jabón. Use agua tibia si está disponible. Si se produce irritación de la piel: Consiga consejo o atención médica.
Si es inhalado	Mueva a la persona al aire libre. Si la persona tiene dificultad para respirar, administre oxígeno. Si no respira, dar respiración artificial.

### INFORMACIÓN GENERAL

Priority WP es un hongo de *Trichoderma* spp. no patógena de origen natural. Es un hongo simbiótico, para ser aplicado como tratamiento de semillas antes de la siembra, como aplicación en surco, empapado o mediante sistemas de fertirrigación y riego en el momento de la siembra. Priority WP no es un producto nutrición vegetal.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar antes de la fecha de vencimiento
- Priority WP se puede aplicar en un sistema de fertirrigación, a las semillas, al surcos o en el riego.
- Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase en un plazo de 24 horas.

#### Para el tratamiento de semillas asegurar la cobertura de cada semilla con el producto.

- Utilizar equipos comerciales de tratamiento de semillas. Consulte la información de calibración del equipo que se utiliza para lograr la dosis de aplicación deseada.
- Priority WP debe mezclarse con agua limpia no clorada.

Una vez que esté bien mezclado en una suspensión, mezcle bien con la semilla.

- Priority WP puede usarse con Bio-Shield y Bio-Shield XT, que es un inoculante diluyente a las dosis especificadas en la etiqueta. Aplique Bio-Shield o Bio-Shield XT con un mínimo de 50% de agua extra limpia no clorada con Priority WP en una mezcla espesa. Una vez que esté bien mezclada en la suspensión, mezcle bien con la semilla. La semilla puede ser pegajosa y dependiendo del tamaño de la semilla y la humedad se podría requerir el agregado de un polímero o talco para secar el tratamiento de semillas. Por favor, consulte a un representante de MBFI para obtener más información.
- Coloque todo el contenido de Priority WP en un tanque de tratamiento dedicado para el uso de productos inoculantes.
- Priority WP debe aplicarse por separado de la aplicación de otro producto para el tratamiento de semillas
- Una vez secas, las semillas no se pegan. Cualquier aglomeración desaparecerá con un mínimo movimiento.
- Proteja la semilla tratada de la luz solar directa.
- Priority WP se puede aplicar en combinación con otros productos de tratamiento de semillas en modo secuencial húmedo o seco. Para conocer el tiempo permitido en la semilla antes de la siembra, consulte la información del Distribuidor.

#### Al aplicar Priority WP infurrow (al chorrillo), empape o fertirrigación, aplique Priority WP en suficiente agua con un aplicador certificado para aplicar al cultivo.

- Utilice un mínimo de 50 L/ha para aplicación en surcos.
- 1000 L/ha para empapado del suelo.
- Fertirrigación un mínimo de 4 pulgadas de agua.

**Dosis recomendadas:**

CULTIVO	RECOMENDACIONES
Alfalfa	Fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de la primavera y continuar a intervalos de 8 semanas.
Algodón	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea. Fertirrigación: Aplique Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea, aplique en V4-6 y haga un seguimiento en la etapa de cápsula
Aromáticas albahaca, Orégano, Romero, Tomillo	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Arvejas	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea.
Almácigos	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 75-150 g/10 L de agua desde el trasplante y aplicar cada 14 días según sea necesario.
Berris	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Aplique de 2 a 5 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Citrus	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Cucurbitáceas	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea en la siembra, realizar 1 o 2 aplicaciones de seguimiento adicionales a intervalos de 4 semanas.
Frutales de carozos	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Girasol	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea.
Maíz	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g por kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea. Fertirrigación: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea aplicar en V4-6 y seguimiento en V10-V12.
Nueces: Nueces, Pecan, Almendras	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Palta	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en temporada de crecimiento.
Papas	Tratamiento de tubérculos: Aplicar Priority WP a razón de 1-10 g/kg de tubérculos. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea. Fertirrigación: aplique Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea, aplique al 90% de emergencia y haga un seguimiento, si es necesario, 21 días después.
Pomáceas	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.

CULTIVO	RECOMENDACIONES
Sorgo	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea.
Sojas	Tratamiento de semillas: Aplique Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea.
Tomates	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea en la siembra, realizar 1 o 2 aplicaciones de seguimiento adicionales a intervalos de 4 semanas.
Trigo	Tratamiento de semillas: Aplicar Priority WP a razón de 1-10 g/kg de semilla. En surco: Aplicar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea. Fertirrigación: aplique Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea en la etapa de macollaje y repita la aplicación 4-6 semanas después
Uvas	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea a partir de principios de primavera y hacer un seguimiento a intervalos de 4 a 8 semanas. Realizar de 2 a 4 aplicaciones en una temporada de crecimiento.
Zanahoria	Empapar o fertirrigar Priority WP a razón de 250 g-5 kg por hectárea en la siembra, realizar 1 o 2 aplicaciones de seguimiento adicionales a intervalos de 4 semanas después.

#### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Este producto debe ser almacenado entre 4 y 27°C. De lo contrario, se producirán daños irreversibles y el producto quedará inservible para su uso. Mantenga los contenedores sellados cuando no estén en uso. Conservar únicamente en el envase original. No reutilice el recipiente vacío. Enjuague bien el recipiente antes de desecharlo. Deseche el líquido de enjuague y el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales.

Mantener alejado de la luz solar directa. Los componentes pierden esterilidad después de abrirse.