MBFi

Leaders in Science. Partners in Growth.

PROGRAMA PAPA



Tratamiento de semillas antes de la plantación.	Plantación (en surco)	Etapa de crecimiento 1 desarrollo de brotes	Etapa de crecimiento 2 crecimiento vegetativo	Etapa de crecimiento 3 iniciación del tubérculo	Etapa de crecimiento 4 aumento de volumen de tubérculos	Etapa de crecimiento 5 Maduración	Sevecencia de hojias	Almacenamiento

							Iniciación				Relleno de tubérculos				Madurez y aumento de volumen		
No	*Nombre del producto*	*N° Aplicaciones y momento de uso*	Plantando *40 bolsas / 1 tonelada*	Semana 1 *90% emergido*	Semana 2 *Iniciación del tubérculo*	Semana 3 *7 D después*	Semana 4 *7 D después*	Semana 5 *7 D después*	Semana 6 *7 D después*	Semana 7 *7 D después*	Semana 8 *7 D después*	Semana 9 *7 D después*	Semana 10 *7 D después*	Semana 11 *7 D después*	Semana 12 *7 D después*	Semana 13 *7 D después*
1.	BIO TECHNICAL	*A la siembra a chorrillo o al surco antes del aporque*		*2 - 4 L / ha*			*2 - 4 L / ha*									
2.	Instructor	*Aplicar en el momento de gancho, en el comienzo de la tuberizacion y repetir a los 21 días*		*200 cc / ha*					*200cc / ha*							
3.	BIO FUNCTIONAL EXTRA	*Desde emergencia, se puede aplicar y repetir cada 21 días hasta un maximo de 3 aplicaciones*				*2 - 4 L / ha*										
4.	X-Treem CaB	*Se puede aplicar cada 15 días desde Floración*											*1 - 3 L / ha*		*1 - 3 L / ha*	
5.	X-Treem N	*Se puede aplicar cada 21 días según necesidad del cultivo*			*5 L / ha*											
6.	poly phate K	*Aplicar a los 50-60 dias desde la plantacion y hasta 30 dias antes de cosecha*								*4 L / ha*						
7.	BIO MoB	*Se puede aplicar 1-3 veces en el cultivo y hasta 30 dias previos a la cosecha y cada 21 dias entre aplicaciones*		*3 - 4 L / ha*				*3 - 4 L / ha*				*3 - 4 L / ha*				
8.	Carbium	*Aplicar cada 7 días*		*3 kg / ha*												
9.	SBF	*Aplicar cada 15 días*			*3 L / ha*			*3 L / ha*			*3 L / ha*			*3 L / ha*		
10.	SIGNAL	*Aplicar cada 21 días*				*3 L / ha*										